

Colangio Pancreatografía Retrograda Endoscópica (Cpre)

- Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada 6 horas antes del procedimiento. Recuerde que la presencia de comida en el estómago, imposibilita la realización del procedimiento.

- Debe traer los exámenes que el personal que le asigne la cita le indique. Pruebas de coagulación (TP, TPT, INR), cuadro hemático con recuento de plaquetas, bilirrubinas, tgo, tgp, fosfatasa alcalina; amilasa o lipasa si se sospecha pancreatitis. Además de ecografía hepatobiliar, endosonografía biliopancreática, TAC o colangiografía magnética donde se confirma presencia de coledocolitiasis o neoplasia. De lo contrario será necesario realizar alguno de estas, pues la CPRE ya no tiene indicación diagnóstica, solo terapéutica.

- Favor informar si usted consume medicamentos anticoagulantes ya que estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado durante y post-procedimiento. En estos casos favor avisar al gastroenterólogo para definir conducta.

- Si el paciente es ambulatorio: Dos horas antes del examen debe tomar cefalexina tabletas x 500 mg, 2 tabletas, vía oral.

Si el paciente se encuentra hospitalizado: Dos horas antes del examen se le debe administrar cefalexina ampolla x 2 gr, 1 ampolla, vía intravenosa.

NOTA: se debe tener en cuenta que si el paciente es alérgico a la penicilina no se le debe administrar cefalexina.

- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.

- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, la diabetes, la tiroides, entre otros debe tomarlos con agua en poca cantidad.

