



**S.E.S.** Hospital  
Universitario  
de Caldas  
*Queremos devolver sonrisas*

# Colonoscopia Total (Diagnóstica Y Terapéutica)

- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.

- Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada el día del examen. O si el examen es en la tarde con 6 horas de ayuno.

- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, la diabetes, la tiroides, entre otros debe tomarlos con agua en poca cantidad.

Para el paciente ambulatorio y hospitalizado (para este último no aplica el punto 1)

- Una semana previa al examen evitar alimentos ricos en fibra, semillas, maíz, granadilla, entre otros.

- El día anterior puede comer hasta el almuerzo, dieta sin fibra.

- Si el examen es en la mañana iniciar preparación a las 5:00 pm con 4 sobres de Nulitelly. Diluir cada sobre en 1 litro de agua y tomar 250 ml cada 15 minutos hasta terminar.

- Venir en ayunas la mañana del examen.

- Si el examen es en la tarde iniciar preparación a las 5:00 pm con dos sobres de Nulitelly. Diluir cada sobre en 1 litro de agua y tomar 250 ml cada 15 minutos hasta terminar. En la mañana siguiente continuar la preparación a las 6:00 am con dos sobres de Nulitelly. Diluir cada sobre en 1 litro de agua y tomar 250 ml cada 15 minutos hasta terminar.

Tenga en cuenta que la preparación debe terminar 6 horas antes de la hora de la cita.

- La preparación puede ser con Nulitelly o KleanPrep. El principio es lo mismo

- POLIETILENGLICOL.

- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.

NOTA: Si el paciente es intolerante a esta preparación, no es mayor de 65 años y no tiene enfermedad renal, falla cardíaca, hepática o gota tiene las siguientes opciones:

- Picoprep
- Travad PIK (Para el paciente hospitalizado, este se encuentra en farmacia)
- Izinova

Estos deben prepararse así:

- Si el examen es en la mañana 1 sobre o frasco de la preparación a las 5:00 pm disuelto en 250 ml de agua y tomar 5 vasos de 250 ml de agua adicionales. A las 10:00 pm segundo sobre disuelto en un vaso de 250 ml de agua y luego tomar 4 vasos de 250 ml de agua adicionales.

- Si el examen es en la tarde 1 sobre de la preparación a las 5:00 pm del día anterior disuelto en 250 ml de agua y tomar 5 vasos de 250 ml de agua adicionales. Luego a las 6:00 am un segundo sobre disuelto en un vaso de 250 ml de agua y luego tomar 4 vasos de 250 ml de agua adicionales.

