

Dilatación de Estenosis Benignas y Malignas por Vía Endoscópica (Acalasia)

- Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada 12 a 24 horas antes del procedimiento. Recuerde que la presencia de comida en el estómago, imposibilita la realización del procedimiento.

- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.

- En caso de que el paciente este anticoagulado o refiera problemas de anticoagulación, se debe verificar con el medico gastroenterólogo la necesidad de pruebas de coagulación (TP, TPT, INR) y recuento de plaquetas en los rangos normales. Recuerde que estos no deben ser mayores a 15 días.

- Si el paciente es ambulatorio: Dos horas antes del examen debe tomar cefalexina tabletas x 500 mg, 2 tabletas, vía oral.

Si el paciente se encuentra hospitalizado: Dos horas antes del examen se le debe administrar cefalexina ampolla x 2 gr, 1 ampolla, vía intravenosa.

NOTA: se debe tener en cuenta que si el paciente es alérgico a la penicilina no se le debe administrar cefalexina.

- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, la diabetes, la tiroides, entre otros debe tomarlos con agua en poca cantidad.

