

Endosonografía Oral Diagnóstica y Terapéutica

- Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada 6 horas antes del procedimiento. Recuerde que la presencia de comida en el estómago, imposibilita la realización del procedimiento.
- Debe traer exámenes previos, ecografía o tomografía.
- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.
- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, la diabetes, la tiroides, entre otros debe tomarlos con agua en poca cantidad.

SI LA ENDOSONOGRAFIA ES TERAPÉUTICA DEBE ADEMÁS DE LO ANTERIOR:

- Traer los exámenes que el personal que le asigno la cita le indico. Pruebas de coagulación (TP, TPT, INR) y recuento de plaquetas en los rangos normales. Recuerde que estos no deben ser mayor a 15 días.
 - Informar si usted consume medicamentos anticoagulantes ya que estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado durante y post-procedimiento. En estos casos favor avisar al gastroenterólogo para definir conducta.
 - Si la lesión es quística y se va a puncionar necesita antibiótico profiláctico. Si el paciente es ambulatorio: Dos horas antes del examen debe tomar cefalexina tabletas x 500 mg, 2 tabletas, vía oral. Si el paciente se encuentra hospitalizado: Dos horas antes del examen se le debe administrar cefalexina ampolla x 2 gr, 1 ampolla, vía intravenosa.
- NOTA: se debe tener en cuenta que si el paciente es alérgico a la penicilina no se le debe administrar cefalexina.

