

Endosonografía Rectal Diagnostica y Terapeutica

- Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada 6 horas antes del procedimiento. Recuerde que la presencia de comida en el estómago, imposibilita la realización del procedimiento
- Debe traer exámenes previos, ecografía o tomografía
- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.
- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, la diabetes, la tiroides, entre otros debe tomarlos con agua en poca cantidad.
- Debe comprar 2 enemas travad.
- 2 horas antes del examen realícese lavado rectal con el enema travad, y una hora antes del examen realícese el otro, trate de retenerlo por 10 o 15 minutos y luego evacuar.

SI LA ENDOSONOGRAFIA ES TERAPÉUTICA DEBE ADEMÁS DE LO ANTERIOR:

- Traer los exámenes que el personal que le asigno la cita le indico. Pruebas de coagulación (TP, TPT, INR) y recuento de plaquetas en los rangos normales. Recuerde que estos no deben ser mayor a 15 días.
- Informar si usted consume medicamentos anticoagulantes ya que estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado durante y post-procedimiento. En estos casos favor avisar al gastroenterólogo para definir conducta.
- Tomar Metronidazol tabletas x 500 mg, 1 tableta 2 horas antes del procedimiento, esto para pacientes ambulatorios y hospitalizados.

