

Gastrostomía Endoscópica

- Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada 6 horas antes del procedimiento. Recuerde que la presencia de comida en el estómago, imposibilita la realización del procedimiento, puede ser alimentación oral o a través de una sonda.
- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.
- Si el usuario se encuentra hospitalizado, 1 hora antes del procedimiento administrar 1 ampolla de Cefuroxima x 750 mg.
- Antes del procedimiento y en el servicio de gastroenterología realice enjuague bucal de la siguiente manera: 200 cc de agua + media cucharita de bicarbonato.
- Favor informar si usted consume medicamentos anticoagulantes ya que estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado durante y post-procedimiento. En estos casos favor avisar al gastroenterólogo para definir conducta.
- Debe traer los exámenes que el personal que le asigno la cita le indico. Pruebas de coagulación (TP, TPT, INR) y recuento de plaquetas en los rangos normales. Recuerde que estos no deben ser mayor a 15 días.
- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, la diabetes, la tiroides, entre otros debe tomarlos con agua en poca cantidad.

