

Polipectomía de Colon a Través de Colonoscopia

- Una semana antes del procedimiento, evite consumir frutas que contengan semillas, alimentos con fibra o integrales.
- Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada 6 horas antes del procedimiento. Recuerde que la presencia de comida en el estómago, imposibilita la realización del procedimiento.
- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22.
- Favor informar si usted consume medicamentos anticoagulantes ya que estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado durante y post-procedimiento. En estos casos favor avisar al gastroenterólogo para definir conducta.
- Debe traer los exámenes que el personal que le asigno la cita le indico. Pruebas de coagulación (TP, TPT, INR) y recuento de plaquetas en los rangos normales. Recuerde que estos no deben ser mayor a 15 días.
- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, la diabetes, la tiroides, entre otros debe tomarlos con agua en poca cantidad.

NOTA

- Si el pólipo está en el lado derecho del colon o el transverso, PREPARAR PARA COLONOSCOPIA TOTAL
- Si el pólipo está en el colon izquierdo, PREPARAR PARA COLONOSCOPIA IZQUIERDA.

