

Test de Inclinación

Debe estar en el hospital 1 hora antes del procedimiento, ya que este debe realizarse estando en completo reposo

Debe venir con el estómago vacío, es decir, no haber comido o bebido nada 8 horas antes del procedimiento.

El día del examen no debe tomarse exámenes de laboratorio
Si usted es mujer y se encuentra en edad fértil, el día antes del examen debe tomarse una prueba de embarazo, la cual debe traer.

Tenga presente que el estado de embarazo es una contraindicación absoluta para la realización de este examen.

No debe haber fumado 8 horas antes del procedimiento.

Si usted toma los siguientes medicamentos: propanolol, metoprolol, atenolol, betaloc, isoptin, lanitop, diltiacen, dilatren, verapamilo, carvedilol, furosemida, losartan, enalapril, captopril, amlodipino u otro antihipertensivo debe suspenderlos 12 horas antes y traerlos el día del examen.

Si es hombre, puede ser necesario rasurar parte del pecho, a fin de que los parches se adhieran bien a la piel.

En caso de cabello largo debe llevarlo recogido.

El día del examen no debe aplicarse cremas ni lociones en el pecho, a fin de que los parches se adhieran bien a la piel

No debe traer maquillaje ni en la cara ni en las uñas

Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada en el brazo derecho con intracat número 18, 20, 22

Debe asistir con ropa cómoda (Sudadera y tenis)

